

PANORAMA

Cuaderno temático



Peste porcina africana: respondiendo a la amenaza global



PERSPECTIVAS

DOSIER

EN EL MUNDO

La peste porcina africana fue descrita por primera vez en Kenia, en 1921, y posteriormente se notificó su aparición en varios países africanos. En las décadas de 1960 y 1970 se registraron numerosos casos de la enfermedad fuera de África, pero la mayoría de ellos fueron erradicados [1]. Durante las décadas de 1990 y 2000, la enfermedad persistió en el continente africano y en la isla italiana de Cerdeña. En 2007 volvió a aparecer fuera de África, en la región del Cáucaso, afectando a Georgia, Armenia y Rusia ese año y a Azerbaiyán en 2008, hasta llegar a la Unión Europea en 2014. En 2018, la enfermedad se propagó a la República Popular China, y posteriormente se ha extendido a otros países asiáticos y europeos en los que nunca antes se había señalado.

En la figura 1 se muestra la distribución mundial reciente de la enfermedad en el periodo de 2016 a 2020 (hasta el 18 de junio).

Desde 2005, la peste porcina africana se ha propagado por 66 países en tres continentes (África, Asia y Europa). Específicamente, hasta junio de 2020, 32 países de África⁽¹⁾, 20 países de Europa⁽²⁾ y 14 países de Asia⁽³⁾ habían notificado casos de esta enfermedad a la OIE.




Fig. 1. Distribución mundial de la peste porcina africana entre 2016 y 2020 (hasta el 18 de junio)

En este contexto, el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE (WAHIS) ha sido esencial para centralizar, verificar y publicar oportunamente información sobre la aparición de brotes de peste porcina africana, proporcionada por las autoridades veterinarias nacionales. En 2020⁽⁴⁾, el 27% de todas las notificaciones inmediatas presentadas a la OIE correspondían a la peste porcina africana.

A través del WAHIS, la OIE informa a la comunidad internacional sobre la evolución de la situación de la enfermedad, mediante [mensajes de alerta](#), informes semanales de seguimiento, boletines epidemiológicos semanales para la región de Asia, y boletines epidemiológicos mundiales quincenales. Además, a fin de garantizar la transparencia de las notificaciones sobre la enfermedad, la OIE emprendió una búsqueda activa de información no oficial, que tiene por objetivo mejorar la transparencia y la puntualidad de la información presentada por los países.

(1) Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Centroafricana (Rep.), Chad, Congo (Rep. del), Congo (Rep. Dem. del), Côte d'Ivoire, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Kenia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Namibia, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue. Fuente: WAHIS, 2020.

(2) Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Bulgaria, Checa (Rep.), Eslovaquia, Estonia, Georgia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia, Ucrania. Fuente: WAHIS, 2020.

(3) Cambodia, China (Rep. Pop.), Corea (Rep. de), Corea (Rep. Dem. Pop. de), Filipinas, Hong Kong (Región Administrativa Especial de la Rep. Pop. China), India, Indonesia, Laos, Mongolia, Myanmar, Papúa Nueva Guinea, Timor-Leste, Vietnam. Fuente: WAHIS, 2020.

(4) Hasta el 24 de junio de 2020.

<http://dx.doi.org/10.20506/bull.2020.1.3118>

[Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE \(WAHIS\)](#)

[Acceso a la interfaz de la base de datos del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE \(WAHIS Interface\)](#)

PERSPECTIVAS

▶ OPINIONES Y ESTRATEGIAS

La peste porcina africana y el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE

PALABRAS CLAVE

#OIE-WAHIS, #Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), #peste porcina africana.

AUTORES

[Departamento de Información y análisis de la sanidad animal mundial](#), Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).



© FotografíaBasica/Getty Images

REFERENCIAS

1. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (2018). – Capítulo 3.8.1. Peste porcina africana (Infección por el virus de la peste porcina africana). *En* Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres, 8.ª edición.

La OIE es una organización internacional creada en 1924. Los 182 Miembros de la Organización le han otorgado el mandato de mejorar la sanidad y el bienestar animal. Actúa con el apoyo permanente de 325 Centros de referencia (expertos científicos) y 12 emplazamientos regionales presentes en todos los continentes.



Siga a la OIE en www.oie.int



@OIEAnimalHealth



World Organisation for Animal Health - OIE



OIEVideo



World Organisation for Animal Health



World Organisation for Animal Health (OIE)



Versión digital: www.oiebulletin.com



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL

Proteger a los animales, preservar nuestro futuro

12, rue de Prony - 75017 Paris, Francia
Tel: +33 (0)1 44 15 18 88 - Fax: +33 (0)1 42 67 09 87 - oie@oie.int